

Cochez la ou les réponses justes

1) Les indications de l'extraction dentaire :

- sont d'ordre local uniquement
- sont d'ordre local et général
- Peuvent être prothétique ou orthodontique
- l'hygiène du patient et sa motivation peuvent orienter vers une attitude conservatrice ou radicale

2) Les règles d'asepsie concernent :

- le praticien uniquement
- le patient uniquement
- le praticien et le patient
- lieu de travail et les instruments

3) Les règles d'asepsie sont respectées :

- avant l'extraction
- pendant l'ex+ action
- après l'extraction
- quand le patient le demande
- Obligatoirement

4) Les instruments nécessaires pour effectuer une extraction dentaire :

- Un davier
- une curette parodontale
- un syndesmotome
- un élévateur
- une râpe à os

5) Le protocole opératoire d'une extraction dentaire :

- anesthésie_syndesmotomie_luxation_extraction
- Asépsie_anesthésie_syndesmotomie_luxation_extraction
- Asepsie_anesthésie_extraction proprement dite
- Anesthésie_asépsie_syndesmotomie_luxation_extraction

- 6) **Quand l'extraction dentaire est faite :**
- le patient est libéré immédiatement
 - l'alvéole doit être révisé
 - le patient n'est pas libéré avant d'obtenir une bonne hémostase
 - vérifier l'intégrité de la dent n'est pas nécessaire
- 7) **Pour prévenir la douleur postopératoire, on prescrit :**
- un antalgique
 - un anti-inflammatoire non stéroïdien
 - un anti-inflammatoire stéroïdien
 - un antibiotique
- 8) **les conseils post opératoire :**
- abstention de fumer
 - sucer le caillot sanguin
 - proscrire les bains de bouche
 - maintenir la compression (3-10min)
- 9) **La stérilisation des instruments doit se faire :**
- A la chaleur sèche
 - A la chaleur humide avec une température de 134°, maintenu au moins 18 minutes.
 - D'abord au poupinel puis à l'autoclave
 - Toutes les réponses sont fausses
- 10) **La pré désinfection :**
- Est encore appelée décontamination
 - Permet d'obtenir des instruments en état de stérilisation
 - a pour objectif de faciliter le nettoyage en évitant le séchage des matières organiques.
 - La durée maximale de trempage est de 15 minutes
- 11) **L'antisepsie**
- Est l'action de détruire la croissance des micro-organismes existants sur des surfaces inertes contaminées
 - est assurée par l'usage des solutions détergentes.
 - l'activité recherchée est bactéricide et fongicide.
 - toutes les réponses sont justes
- 12) **Quels sont les patients chez qui nous devons respecter les mesures de précaution standards :**

- Les hémophiles
- Les usagers de drogue par voie nasale
- Les cardiopathes
- Les hémodialysés
- Les hypothyroïdiens

13) La vaccination contre l'hépatite B :

- Est obligatoire chez tous les praticiens et personnel soignant
- Est proscrite chez le praticien qui a un membre de sa famille porteur de sclérose en plaque ou d'handicap mental
- La vaccination contre VHC et VIH est obligatoire aussi.

14) Le kyste péri-coronaire d'éruption :

- Est plus fréquent sur les canines de lait en pré émergence
- Le diagnostic différentiel se pose avec l'angiome
- Résulte de l'accumulation de sang qui dilate l'espace autour de la couronne dentaire.
- L'attitude thérapeutique est l'énucléation de toute la paroi kystique

15) Parmi les causes de retard d'éruption d'une incisive centrale nous citerons :

- Un kyste radiculo-dentaire sur l'incisive lactéale sous jacente mortifiée
- Un kyste dentigère développé sur l'incisive lactéale sous jacente
- Une gencive fine, peu fibreuse
- La présence d'un germe surnuméraire

16) Les anesthésiques locaux :

- Bloquent de façon irréversible le flux nerveux
- Bloquent de façon réversible le flux nerveux
- Préviennent la dépolarisation de la membrane nerveuse
- Inhibent le Na⁺ entrant

17) Les anesthésiques locaux à fonction amide possèdent :

- Extrémité aromatique
- Extrémité aminée
- Une chaîne intermédiaire porteuse d'une liaison ester
- Toutes les réponses sont justes

18) les vasoconstricteurs sont employés en stomatologie pour :

- leur propriétés d'augmenter la durée d'action de l'anesthésique

- lutter contre l'effet vasoconstricteur de l'anesthésique

diminuer le saignement per-opératoire

- accélérer la résorption du produit anesthésique

19) les réactions d'hypersensibilité sont dues le plus souvent :

- au Parabène

- aux sulfites

- aux conservateurs

toutes les réponses sont fausses

20) l'emploi du vasoconstricteur est contre-indiqué chez :

- les patients ayant subi une radiothérapie cervico-faciale

- les patients sous biphosphonates

- les diabétiques type I équilibrés

les cardiopathes ayant fait un infarctus ancien du myocarde

21) l'anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur :

- est vivement indiquée chez les patients présentant un désordre hématologique

- est contre indiquée chez les patients sous Sintrom®

se pratique au niveau de l'épine de Spix

nécessite une aiguille longue et fine

22) l'anesthésie para-apicale :

est indiquée pour toutes les dents maxillaires

se pratique en 2 temps vestibulaire et palatin

- se caractérise par un temps de prise rapide au niveau mandibulaire

- toutes les réponses sont justes

23) l'articaine :

- est contre-indiquée chez la femme enceinte

- présente un poids moléculaire très élevée inhibant sa diffusion à travers la barrière placentaire

- présente un effet foeto-toxique

elle est connue par sa toxicité cardiaque

24) Les complications per opératoires peuvent être :

Muqueuses, par dilacération et lésion de la muqueuse buccale

Dentaires, par fracture d'une dent ou d'un apex

- Musculaires, par traumatisme

- Toutes les réponses sont justes

25) En cas d'une fracture des rebords alvéolaires, il faudra :

- Libérer le patient directement
- Juste retirer le fragment mobile
- Disséquer le fragment mobile, régulariser les bords alvéolaires et suturer.
- Donner un traitement antibiotique

26) La projection d'une dent dans le sinus peut être due à :

- Un sinus proéminent et volumineux
- Rapport étroit entre les dents dites antrales et plancher sinusien
- Un curetage maladroit
- Toutes les réponses sont justes

27) Lors de l'injection de l'anesthésie, le patient peut développer :

- Un malaise type lipothymie ou syncope
- Des réactions allergiques
- Des troubles de l'hémostase
- Des troubles de la vision

28) En cas de survenue d'une lipothymie :

- Il faudra continuer le soin quelque soit la décision et la coopération du patient
- Allonger le patient, éventuellement surélever les jambes.
- Lever toutes causes de compression type cravate ou ceinture
- Toutes les réponses sont justes

29) On peut diagnostiquer la survenue d'une hypoglycémie per opératoire chez un diabétique :

- Par la survenue de palpitations, pâleur, nausées et une fatigue intense
- Par la survenue d'une sécheresse buccale
- Par la survenue d'une hypotension artérielle
- Toutes les réponses sont justes

30) Les accidents allergiques peuvent survenir :

- Sous forme d'un syndrome grippale
- Sous forme d'œdème de Quincke
- Sous forme de choc anaphylactique
- Toutes les réponses sont justes