

Nom..... Prénom.....

Cochez la ou les réponses justes. Répondez aux questions en cochant à gauche

1) L'améloblastome :

- A. Est une tumeur moins fréquente que les autres tumeurs odontogènes
- B. S'observe chez le sujet d'âge moyen entre 10 et 15 ans
- C. Siège dans 80 % des cas, au niveau de la mandibule
- D. Peut présenter un seul aspect radiologique

2) L'odontome :

- A. Est une tumeur épithéliale
- B. Se manifeste radiologiquement par une géode uniloculaire
- C. Entraîne le plus souvent, un retard d'éruption dentaire
- D. Ressemble à une tumeur sans présenter les caractéristiques vraies de la tumeur.

3) L'Ostéome :

- A. Est une lésion propre au massif facial,
- B. Touche la femme avant 40 ans au niveau de la mandibule.
- C. Radiologiquement donne une image radio-opaque toujours centro-osseuse
- D. La présence de plusieurs ostéomes doit faire évoquer un syndrome de GORLIN.

4) Dans les tumeurs et pseudotumeurs non odontogènes des maxillaires on retrouve :

- A. Les Tumeurs vasculaires
- B. Le Fibrome cémento-ossifiant (fibrome cimentifiant...)
- C. Le Cémentoblastome bénin
- D. Les Tumeurs et pseudotumeurs riches en cellules géantes

5) Dans la tuberculose buccale, le chancre d'inoculation se présente sous la ou les forme(s) suivante(s) :

- A. Une ulcération extensive et indolente, de contour régulier et surélevé, à fond uniforme, jaunâtre souple et sans halo périphérique rougeâtre comme pour l'aphie
- B. Un ulcère douloureux à bords fins et décollés, à surface végétante et peu creusante recouverte d'un exsudat gris jaunâtre,
- C. Une ulcération extensive à bords déchiquetés, à fond brun insuré entourée par un halo périphérique rougeâtre,
- D. Un érythème sur lequel apparait une lésion blanchâtre riche en bacilles de Koch visibles au microscope

6) Une gomme est :

- A. L'expression de la syphilis secondaire,
- B. Le résultat d'une dissémination hémalégitime du BK à partir d'un foyer tuberculeux préexistant,
- C. Une manifestation de la syphilis tertiaire.
- D. Un nodule hypodermique indolore et mobile, se ramollissant, s'ulcérant et se cicatrisant laissant des cicatrices.

7) La syphilis secondaire est caractérisée par :

- A. L'installation de gommes osseuses multiples,
- B. L'apparition de la roséole cutanée, de syphilides et de plaques muqueuses,
- C. La névrose caudale,
- D. L'apparition de lésions végétantes hyperkératosiques

8) Le muguet est une stomatite :

- A. Candidosique caractérisée par des lésions érosives sévères sur un érythème diffus,
- B. Chronique végétante typique kéraïnolique,
- C. Granulomateuse chronique causée par l'Actinomyces viscosus,
- D. Aigue et diffuse caractérisée par un érythème sur lequel apparaissent des plaques blanches facilement éliminables à l'aide d'une lingette.

9) Dans la névralgie trigéminalle essentielle, parmi les signes cliniques permettant le diagnostic positif :

- A. L'apparition d'un état dépressif entre les crises avec profonds pleurs et hyperhidrose,
- B. Une fréquence variable de crises survenant de la nuit dans le territoire sensitif,
- C. L'existence de la zone gâchette connue localement déclenchante
- D. L'existence de crises paroxysmiques

10) Le syndrome de Claude Bernard-Horner accompagne toujours :

- A. Les névralgies par désafférentation sensitive
- B. Les formes sévères d'algie vasculaire
- C. La névralgie trigéminal essentielle
- D. La névralgie glossopharyngée secondaire à une tumeur glomique

11) Sémiologie de la Paralyse faciale périphérique (PFP) :

- A. Atteinte unilatérale et totale de tous les muscles de l'hémi face (étage supérieur et inférieur).
- B. Signe de Charles Bell positif.
- C. Associée souvent à une hémiparésie homolatérale.
- D. Des dysphagies.

12) Caractéristiques du Processus tumoral bénin :

- A. Lenteur d'évolution.
- B. Respectant ou refoulant les éléments voisins.
- C. Les éléments cellulaires du tissu tumoral rappellent morphologiquement et sur le plan fonctionnel l'acellule d'origine, il n'y a pas d'anomalie cyto-nucléaire.
- D. Bonne évolution après traitement, avec un pronostic généralement bon.

13) Les condylomes acuminés, cocher la ou les réponses justes :

- A. C'est une affection sexuellement transmissible.
- B. Siège rare dans la cavité buccale où il peut être la conséquence d'une auto-inoculation à partir d'un condylome acuminé génital.
- C. Il s'observe avec une incidence accrue chez les malades infectés par le VIH.
- D. Aspect radio-clinique proche de l'hyperplasie du dentier.

14) Les hémangiomes et les malformations vasculaires sont caractérisés par :

- A. La coloration de la lésion.
- B. Le risque hémorragique.
- C. L'incertitude évolutive et thérapeutique.
- D. L'évolution rapide et incontrôlée.

15) La Grenouillette, cocher la ou les réponses justes :

- A. C'est une variété de mucocèles qui siège exclusivement dans le plancher de la bouche.
- B. Elle naît des canaux des glandes salivaires sous maxillaire, sublinguale, ou des glandes salivaires accessoires du plancher buccal.
- C. Le traitement consiste en l'exérèse chirurgicale ou la marsupialisation.
- D. Un risque accru de transformation maligne.

16) La position latérale de sécurité (PLS) est une technique permettant de :

- A. Placer facilement un patient inconscient qui respire, sur le côté afin de préserver l'efficacité de sa ventilation.
- B. Prévenir l'écoulement de liquide dans les poumons.
- C. Éviter l'obstruction des voies aériennes par la langue.
- D. Sauvegarder l'activité cardiaque.

17) La position de TRENDELENBURG est indiquée en cas de :

- A. Malaise vagal.
- B. Arrêt cardiaque.
- C. Accident Hypertensif.
- D. Inhalation de corps étranger.

18) Parmi les propositions suivantes, lesquels des réservoirs, dérivent les kystes des maxillaires ?

- A. Le bourgeon dentaire
- B. Les restes épithéliaux de Malassez.
- C. Les résidus de la lame dentaire
- D. Le sac périovculaire

19) La persistance de dents temporaires, l'absence d'une dent sur l'arcade doit faire suspecter :

- A. La présence d'un kyste folliculaire.
- B. L'Agénésie dentaire
- C. La présence d'un kyste inflammatoire
- D. La présence d'un kyste paradentaire

20) L'image radiologique en carafe caractérise :

- A. Le développement des résidus d'une paroi kystique
- B. Le kyste résiduel
- C. Le kyste dentaire