

1. Colle biologique de fibrine :
 - A. Est une gaze hémostatique non résorbable d'origine naturelle ou synthétique
 - B. Forme au contact du sang une masse gélatineuse foncée
 - C. Est une colle constituée de fibrinogène humain lyophilisé
 - D. Ne permet pas d'obtenir un caillot adhérent à la plaie.
2. L'anesthésie avec vaso-constricteur permet :
 - A. D'augmenter le saignement ;
 - B. D'augmenter le temps de travail ;
 - C. D'augmenter la durée de l'anesthésie ;
 - D. D'augmenter la diffusion de l'anesthésie.
3. Dans les cellulites séreuses d'origine dentaire :
 - A. Le traitement de 1^{ère} intention est l'association des betalactamines et macrolides
 - B. L'antibiotique de choix est l'Amoxicilline en absence d'allergie
 - C. Le traitement médicamenteux est suffisant
 - D. Le traitement étiologique est le drainage
4. le traitement de la cellulite suppurée :
 - A. Nécessite une thérapeutique médico-chirurgicale
 - B. Est basé uniquement sur un traitement Antibiotique avec avulsion de la dent causale
 - C. L'avulsion de la dent causale est systématique
 - D. Nécessite un drainage de la collection purulente sans recours au traitement étiologique
5. Anesthésie à l'épine de spix trouve son indication pour extraction :
 - A. Des molaires et prémolaires inférieures ;
 - B. Des molaires supérieures et inférieures ;
 - C. Des dents mandibulaires avec un trismus ;
 - D. Aucune réponse n'est juste
6. chez les patients traités par Acide Zolédronique
 - A. Les avulsions dentaires sont sans risque pendant la fenêtre thérapeutique (arrêt temporaire d'Acide Zolédronique)
 - B. Les avulsions dentaires ne sont pas contre indiquées une année après arrêt d'Acide Zolédronique
 - C. Les avulsions dentaires se feront avec couverture antibiotique administrée après l'acte et prolongées pendant une semaine
 - D. Toutes les réponses sont fausses
7. Clarithromycine est:
 - A. Une molécule appartenant à la famille des bétalactamine
 - B. Associée toujours à la pénicilline
 - C. Une molécule appartenant à la famille des Aminosides
 - D. Indiquée en cas d'allergie à la pénicilline
8. La forme suppurée de la cellulite péri-maxillaire est caractérisée sur le plan clinique par une tuméfaction
 - A. Rougeâtre, arrondie, recouverte d'une peau lisse et tendue ;
 - B. Bien limitée douloureuse avec signe de Godet positif et une température locale élevée ;
 - C. Arrondie ou ovale en forme de nodule dur adhérente à la peau ;
 - D. Dure associée à un trismus et hypoesthésie labio-mentonnaire.
9. Dans les cellulites chroniques, la palpation permet d'apprécier :
 - A. Un cordon fibreux reliant la dent à la tuméfaction ;
 - B. Une tuméfaction sans chaleur particulière, avec une douleur insupportable
 - C. Une tuméfaction élastique, mobile avec température locale légèrement augmentée ;
 - D. Une tuméfaction indolore avec écoulement purulent à la palpation.
10. L'anesthésie à l'épine de spix est réalisée sans vasoconstricteur pour :
 - A. assurer la diffusion de la solution anesthésique au niveau de la région mandibulaire ;
 - B. éviter un œdème latéro-pharyngé ;
 - C. ne pas prendre le risque d'injecter la solution anesthésique dans un vaisseau sanguin ;

D. empêcher la diffusion rapide de la solution anesthésique.

11. l'hémorragie post extractionnelle

A. Est toujours de cause locale

B. Peut-être de cause locale ou générale

C. Est toujours de cause générale

D. Nécessite l'application des moyens locaux d'hémostase et un bilan biologique si la cause locale est retrouvée

12. Un cardiopathe à risque infectieux consulte pour une cellulite circonscrite cervico-faciale d'origine dentaire, nécessite :

A. Une antibioprofylaxie

B. Une antibiothérapie de couverture

C. Une antibiothérapie curative

D. Toutes les réponses sont justes

13. Un patient hémophile nécessitant l'extraction dentaire, que demandez-vous ?

A. Une NFS

B. Une sérologie HBS, HCV, HIV

C. Urée, créatinémie

D. Une sérologie, Un TCK

14. Chez un hémophile sévère, nécessitant l'extraction de la 46, il est recommandé d'effectuer :

A. Une substitution du facteur manquant

B. Une anesthésie à l'épine de spix

C. Une anesthésie sans adrénaline

D. Une compression bidigitale sans moyens d'hémostase locaux

15. Le risque hémorragique chez le patient sous chimiothérapie est inhérent à :

A. Une thrombopathie

B. Une thrombopénie

C. Une leucopénie

D. Toutes les réponses sont justes

16. Les extractions dentaires chez un cardiopathe sous anticoagulants nécessitent :

A. Une antibioprofylaxie

B. Une anesthésie sans vasoconstricteur

C. Une prémédication sédatrice

D. Une application des moyens locaux d'hémostase

17. Un cardiopathe sous AVK (anti vitamine K) se présente pour une pulpo-desmodontite sur la 48, vous réalisez l'extraction sous :

A. Une antibioprofylaxie

B. Un anti-inflammatoire non stéroïdien pour le soulager

C. Une anesthésie tronculaire à l'épine de spix et une anesthésie locale

D. Une anesthésie locale

18. Chez un cardiopathe porteur d'une prothèse valvulaire présentant une cellulite circonscrite aigue suppurée d'origine dentaire, qu'elle serait votre conduite à tenir dans le cadre de l'urgence ?

A. demander un avis du médecin traitant et antibiothérapie curative

B. Une antibioprofylaxie et effectuer un drainage

C. Effectuer un Drainage en urgence et hospitalisation du patient

D. Prescrire Une antibiothérapie curative et drainage

19. Une patiente sous biphosphonates par voie orale se présente pour une pulpite sur la 46, que préconisez-vous ?

A. l'extraction avec anesthésie tronculaire et locale sans vasoconstricteur

B. l'extraction sous une antibiothérapie poursuivie jusqu'à cicatrisation

C. l'extraction sans vasoconstricteur

D. aucune réponse n'est juste

20. En cas de complication de l'avulsion dentaire, l'alvéolectomie est réalisée avec :

A. Une fraise boule montée sur turbine sous irrigation ;

B. Une fraise fissure montée sur pièce à main sans irrigation ;

C. Une fraise boule montée sur pièce à main sans irrigation ;

D. Aucune réponse n'est juste.



Epreuve de CC Patho - 5ème - année médecine dentaire - 2020/2021

Date de l'épreuve : 19/06/2021

Page 1/1

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	C	1
2	C	1
3	B	1
4	A	1
5	D	1
6	D	1
7	D	1
8	B	1
9	A	1
10	C	1
11	B	1
12	C	1
13	B	1
14	A	1
15	B	1
16	D	1
17	D	1
18	B	1
19	D	1
20	D	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0

PLATFORME

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire