

1. La forme ulcéreuse du cancer de la cavité orale :

- A. Est une forme clinique fréquente
- B. présente un bord régulier et souple
- C. présente un bord irrégulier, induré, surélevé
- D. Ne saigne jamais

2. La tumeur maligne est caractérisée par :

- A. Un développement de tumeurs secondaires dans d'autres viscères
- B. Une absence de récurrence après exérèse totale
- C. Une prolifération anarchique des cellules
- D. un développement local dans son tissu d'origine

3. La reconstitution post-chirurgicale en cas de cancer de la cavité orale :

- A. Réalisée uniquement avec des greffons osseux
- B. Peut se faire avec des lambeaux myo-cutanés
- C. Est réalisée par un lambeau pectoral pour le cancer de la langue
- D. Peut être remplacée par une simple régénération muco-périostée

4. La classification histologique des carcinomes des maxillaires englobe les :

- A. carcinomes améloblastiques
- B. carcinomes intra-osseux primitifs
- C. carcinomes sclérosants odontogéniques
- D. carcinomes à cellules mélanocytaires

5. Le carcinome améloblastique :

- A. Combine les caractéristiques histologiques de l'améloblastome à celles du carcinome épidermoïde
- B. Ne fait jamais suite à un améloblastome préexistant
- C. Présente une forme primitive histologiquement, différente de la secondaire
- D. Est plus fréquent à la mandibule

6. Les sarcomes des maxillaires sont des tumeurs malignes connues par une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, elles :

- A. prennent naissance à partir du tissu vasculaire
- B. siègent exclusivement au niveau des os maxillaires
- C. Peuvent apparaître de manière spontanée
- D. se développent à partir d'une tumeur bénigne osseuse préexistante

7. Parmi les lésions potentiellement malignes; l'erythroplasie est :

- A. Considérée comme le premier signe clinique du carcinome épidermoïde.
- B. Une lésion vésiculo-bulleuse puis érosive.
- C. Une lésion qui peut être uni, ou pluri focale.
- D. Une plaque veloutée, rouge, brillante et douloureuse.

8. L'atteinte du périoste par un ostéosarcome s'exprime radiologiquement par une image :

- A. Radio-opaque pommelée visible sur un cliché panoramique
- B. Radio-opaque pommelée visible sur un cliché occlusal
- C. En feu d'herbe lorsque le périoste est détruit
- D. En feu d'herbe au début de l'atteinte du périoste

9. L'ostéosarcome ou sarcome ostéogénique est une tumeur qui :

- A. Elabore du tissu cartilagineux ostéoïde
- B. A pour siège de prédilection la mandibule chez l'enfant autour de 10 ans
- C. A pour siège de prédilection la mandibule chez l'adulte autour de 30 ans
- D. Peut commencer par une algie surtout nocturne

10. Dans les carcinomes à point de départ sinusien, l'étiologie incriminée est :

- A. La réaction inflammatoire sinusienne chronique fréquente

- B. La communication bucco-sinusienne
  - C. La sinusite aiguë
  - D. La toxicité industrielle du nickel et du chrome
11. La **dysplasie sévère** est :
- A. Une atteinte de plus des 2/3 de l'épaisseur de l'épithélium
  - B. Un signe de non rupture de la membrane basale
  - C. Une atteinte seulement des 2/3 de l'épaisseur de l'épithélium
  - D. Généralement irréversible et les mitoses sont atypiques
12. La **fibrose sous-muqueuse** se caractérise par :
- A. La formation de vésicules suivies d'ulcération symptomatique
  - B. Un blanchiment atrophique de la muqueuse
  - C. Une localisation labiale et gingivale
  - D. Une carence en vitamine B, C et en fer
13. Une **exérèse locale radicale** :
- A. Consiste à réséquer sans marge de tissu sain la lésion tumorale maligne
  - B. Nécessite une marge de tissu sain en périphérie et en profondeur
  - C. Peut être proposée pour le traitement du cancer de la mandibule
  - D. Est conduite en monobloc emportant la tumeur et ses extensions avec les ganglions
14. Parmi les **signes d'appel des sarcomes des maxillaires** nous pouvons avoir :
- A. Une perte de poids brutale
  - B. Une mobilité dentaire sans cause apparente
  - C. Un élargissement du désmodonte avec une disparition de la lamina dura
  - D. Un élargissement du désmodonte avec une calcification de la lamina dura
15. Les **virus oncogènes** :
- A. Sont des virus qui infectent les cellules cancéreuses
  - B. Sont des virus ayant la capacité de rendre cancéreuse la cellule qu'ils infectent
  - C. Peuvent être un papillomavirus
  - D. Peuvent être un paramyxovirus
16. Lors de la **cancérogenèse**, la phase de progression :
- A. Suit la phase d'initiation
  - B. Est une phase préclinique
  - C. Se caractérise par la rupture de la membrane basale
  - D. Aboutit à l'apparition des métastases
17. Le **facteur de risque prédominant du carcinome épidermoïde** est :
- A. L'HPV
  - B. L'intoxication alcool-tabagique
  - C. Les carences nutritionnelles
  - D. La mauvaise hygiène bucco-dentaire
18. Le **lupus érythémateux discoïde** :
- A. Est une affection chronique auto-immune
  - B. Est une affection congénitale liée au sexe
  - C. Est de localisation labiale lors de sa transformation maligne
  - D. Est traité par le laser CO<sub>2</sub>
19. Le **lichen plan atrophique** est caractérisé par :
- A. Une localisation bilatérale
  - B. Une Hyperkératose et un érythème sans érosion
  - C. Une Hyperkératose et un érythème avec érosion
  - D. Un aspect lisse et brillant avec des stries lichénoïdes.
20. La **forme verruqueuse du cancer buccal**
- A. Est une forme rare
  - B. Est agressive localement
  - C. Se développe le plus souvent sur une kératose tabagique
  - D. Est recouverte à la surface de fines villosités blanchâtres

## Epreuve de Patho - 5ème - année de médecine -2020/2021

Date de l'épreuve : 27/03/2021

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	AC	1
2	AC	1
3	BCD	1
4	ABC	1
5	AD	1
6	ACD	1
7	A	1
8	C	1
9	CD	1
10	AD	1
11	CD	1
12	ABCD	1
13	BD	1
14	BC	1
15	BC	1
16	CD	1
17	B	1
18	AC	1
19	AD	1
20	ABCD	1
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0
30		0
31		0
32		0
33		0
34		0
35		0

N°	Rép.	Barème
36		0
37		0
38		0
39		0
40		0

— PLATFORME —  
**RESIDENTAIRE**