

- 9) L'anesthésie réalisée dans le vestibule du secteur molaire mandibulaire, complétant une tronculaire à l'épine de spix est destinée au :
- a) Nerf lingual
 - b) Nerf auriculo temporal
 - c) Nerf buccal
 - d) Muscle buccinateur

10) Lors de l'anesthésie à l'épine de spix :

- a) On doit obtenir le fourmillement de l'hémi langue
- b) On doit obtenir le fourmillement de l'hémi lèvre
- c) Une anesthésie au trou mentonnier doit être compléter
- d) Toutes les réponses sont justes

11) En cas d'extraction difficile d'une 36 on effectue :

- a) Une séparation radiculaire
- b) On utilise un davier avec pointe vestibulaire
- c) On peut avoir recours au pied de biche
- d) Un elevateur droit suffit pour faire l'extraction.

12) Le cone beam est préconisé dans les cas suivants :

- a) Exploration pré-implantaires
- b) Exploration des sinus de la face et de la base du crâne
- c) Pathologie de l'ATM (articulation temporo-mandibulaire)
- d) Exploration des sinus frontaux

13) Un patient se plaint de xerostomie, avec l'aide d'un abaisse langue comment l'évaluer ?
 en... colorant... les... amygdales.

14) L'état des reliefs osseux en cas de traumatisme est souvent facile à effectuer :

Vrai

faux

lisez la phrase suivante

si plaquettes peuvent être élevées on parle de ... thrombocytose
 si plaquettes peuvent être abaissées on parle de ... thrombopénie ...

les indications de l'anesthésie tronculaire ?

extraction de plusieurs dents au même temps

extraction d'une molaire mandibulaire

e) ... chirurgie ... d'une tumeur mandibulaire

d) ... extraction d'une DDS (dent de sagesse)

17) Le davier d'une 6 mandibulaire présente des mors symétriques :

Vrai

faux

18) Le temps gingival consiste à vérifier l'alvéole, à la recherche d'un fragment(s) dentaire(s) ou osseux :

Vrai

faux

19) Le palper bimanuel intéresse l'examen des aires ganglionnaire :

Vrai

faux ResiDentaireTM

- 1) Lors d'un examen clinique, l'examen des ligaments recherchera :
- a) La coloration
 - b) La souplesse
 - c) présence d'éventuelles lésions cutanées (plaies, tuméfactions, éruptions, cicatrices...)
 - d) Présence de douleurs
- 2) Cochez parmi ces propositions les techniques radios extra-orales que vous connaissez :
- a) La radiographie Retro-alvéolaire
 - b) Maxillaire défilé
 - c) Orthopantomogramme
 - d) Blondeau
- 3) L'orthopantomogramme est un cliché :
- a) Qui permet la comparaison bilatérale
 - b) Riche en informations concernant la région antérieure
 - c) Riche en informations concernant l'étude pré-implantaire
 - d) Permet une vue globale des maxillaires et d'autres structures anatomiques
- 4) On évoque une microcytose devant :
- a) Un taux de Hg diminué
 - b) Un taux de VGM diminué
 - c) S'observe lors d'une carence en vitamine B12
 - d) Toutes les réponses sont justes
- 5) Lors d'extraction multiples de la région maxillaire antérieure on doit effectuer :
- a) Une tronculaire afin éviter les infiltrations para-apicales
 - b) Une analgésie canine haute tribulaire du nerf alvéolaire antérosupérieur
 - c) Une analgésie canine haute tribulaire du nerf infra orbitaire
 - d) Une anesthésie par infiltration
- 6) Une augmentation des globules blancs peut évoquer :
- a) Une infection
 - b) Une inflammation
 - c) Une hémopathie
 - d) Une alteration des défenses immunitaires.
- 7) L'INR est demandé pour :
- a) Contrôler les malades traités par héparines
 - b) Contrôler les malades traités par les Antivitamines K (Sintram)
 - c) La zone thérapeutique doit se situer entre 2 et 4
 - d) Explore la voie commune de la coagulation
- 8) On peut effectuer des extractions dentaires avec un taux de plaquettes de :
- a) 80 000
 - b) 120 000
 - c) 150.000
 - d) Toutes les réponses sont justes