

Dr LAGROUM.S

1^{ère} EMD de Parodontologie 4^{ème} année

Nom et prénom de l'étudiants:

Cochez la ou les réponses justes


1- Les schémas si dessous correspondent respectivement et selon l'ordre A B C

A-




1

B-




C-




- ✓
- a- A-bisouri de kirkland, B- bistouri d'orbon, C-bistouri de Bard Parker
 - b- A-Bistouri d'Orbon, B-bistouri de Buck, C-manche de Bard Parker
 - c- A-Bistouri de Buck, B- bistouri de kirkland, C- Précelle de Cran Kaplan
 - d- A-Bistouri de kirkland, B-bistouri d'Orbon, C- Précelle de Cran Kaplan

2- Cet instrument sert




- a- pour insérer les lames jetables
- b- pour les incisions interdentaires
- c- pour le marquage des poches
- d- pour les ostéotomies

3- Les schémas si dessous représentent deux étapes d'une technique qui est






- a- l'Excision Cunéiforme
- b- Un type de Gingivectomie
- c- l'Exérèse d'épulis
- d- une Gingivoplastie


4-



Dans la technique ou la première incision est schématisée si dessus, la 2^{ème} incision est réalisée de la manière suivante



5- Le schéma si dessous correspond



- a- au marquage des poches pour gingivectomie
- b- au sondage des poches
- c- à la mesure de la hauteur de gencive attachée
- d- à la technique de Papillectomie

6-La Gingivectomie à biseau externe est indiquée

- a- en présence de hauteur suffisante de gencive attachée
- b- en cas de hauteur insuffisante de gencive attachée
- c- dans le cas de poches de texture molle
- d- dans le cas de poches de texture fibreuse

7- Dans la Gingivectomie à biseau externe l'incision

- a- est réalisée légèrement coronairement aux points sanglants.
- b- est réalisée légèrement apicalement aux points sanglants.
- c- est réalisée au même niveau des points sanglants
- d- est réalisée à une distance des points sanglants qui est en fonction de la dextérité du praticien

8- Le tracé d'incision dans la Gingivectomie à biseau externe

- a- est uniquement discontinu
- b- est uniquement continu
- c- peut être réalisé en discontinu ou en continu
- d- Toutes les réponses sont fausses

ResiDentaireTM

9- La Gingivoplastie est un acte

- a- qui peut être réalisé seul ✓
- b- qui complète obligatoirement la GBE ✓ 0,75
- c- qui complète obligatoirement la GBI ✓
- d- qui complète obligatoirement une papillectomie ✓

10- Dans la gingivectomie à biseau interne l'incision

- a- est orienté en direction coronaire
- b- est orienté en direction apicale ✓
- c- son angulation dépend de l'épaisseur de la gencive ✓
- d- son angulation dépend de la profondeur des poches. ✓

11- Le surfaçage radiculaire est associé

- a- à l'ENAP ✓
- b- au curetage parodontal ✓
- c- au curetage gingival ✓
- d- au curetage radiculaire ✓

12- Dans les parodontites agressives l'antibiothérapie systémique

- a- n'est pas toujours associée à une thérapie mécanique
- b- est toujours associée à une thérapie mécanique ✓
- c- n'est pas toujours obligatoire
- d- est systématique ✓

13- Le schéma si dessous correspond à un



ResiDentaireTM

- 0,5
- a- procédé à libération lente d'antiseptique
 - b- procédé à libération lente d'antibiotique
 - c- procédé d'irrigation sous gingivale d'antiseptique
 - d- procédé à libération rapide d'antibiotique
- (1)

14- La maintenance

- 1/3
- a- implique, à la fois, une réévaluation continue de l'état parodontal et un traitement prophylactique.
 - b- implique uniquement une réévaluation continue.
 - c- peut être remplacé par le terme soins parodontaux de soutiens
 - d- débute immédiatement après la fin du traitement actif

15- La thérapeutique parodontale de soutien palliative

- a- concerne la population générale, non atteinte par les maladies parodontales.
- b- s'applique à des patients ayant souffert d'au moins un épisode de maladie parodontale.
- c- est réservée aux patients ayant des maladies systémiques, contre-indiquant une approche parodontale classique.
- d- est programmée après chirurgie parodontale.

16- La périodicité de la thérapeutique parodontale de soutien secondaire est

- a- semestrielle.
 - b- pendant le 1^{er} semestre bimensuelle à trimestrielle et à vie trimestrielle à semestrielle.
 - c- pendant le 1^{er} semestre hebdomadaire et à vie trimestrielle.
 - d- pendant la 1^{ère} année bimensuelle et à vie trimestrielle.
- (A)

17- Les moyens utilisés en thérapeutique parodontale de soutien palliative sont

- a- enseignement à l'hygiène bucco-dentaire, détartrage, surfaçage radiculaire, antibiothérapie et antiseptique.
- b- enseignement à l'hygiène buccodentaire et détartrage uniquement.
- c- enseignement à l'hygiène buccodentaire, détartrage et surfaçage radiculaire.
- d- enseignement à l'hygiène buccodentaire uniquement.
- e- toutes les réponses sont fausses.

ResiDentaireTM

18- Sont exclus de la thérapeutique de soutien

- a- les patients ayant un contrôle de plaque insuffisant.
- b- les patients ayant un contrôle de plaque efficace et une réponse tissulaire à la thérapeutique initiale satisfaisante pour tous les secteurs.
- c- les patients avec des récidives.
- d- toutes les réponses sont fausses.

19- La classification de TECUCIANU 1976 de la chirurgie parodontale est basée sur

- a- la chronologie thérapeutique
- b- le tissu concerné
- c- le caractère prédominant
- d- le type de cicatrisation

ResiDentaireTM

20- Le rôle du pansement parodontal est

- a- permettre l'affrontement des berges des tissus incisés.
- b- replacer les tissus dans une position anatomique et esthétique.
- c- diminuer le saignement post - opératoire.
- d- assurer la revascularisation des berges.

CT

- 1) D
- 2) A
- 3) AB
- 4) A
- 5) A
- 6) AD
- 7) B
- 8) C
- 9) ABD
- 10) - BCD

- 11) ABD
- 12) BD
- 13) CD
- 14) ACD
- 15) C
- 16) B
- 17) A
- 18) D
- 19) C
- 20) C