

la (les) réponses justes.

## 1) le DIAGNOdent :

- 1) Est un outil qui offre le meilleur rapport qualité / prix
- 2) Il renseigne sur le type de thérapeutique qui devra être instauré
- 3) C'est un outil diagnostique très fiable pour la détection des lésions dentinaires
- 4) Mesure le différentiel électrique entre la résistance électrique des tissus sains et celle des tissus cariés
- 5) Toutes les réponses précédentes sont fausses

## 2) le DIFOTI :

- 1) A la capacité de détecter les lésions carieuses avant leurs apparitions sur la radiographie
- 2) L'apport de la caméra sur le dispositif a engendré une augmentation de volume de celui-ci et la manipulation s'avère alors plus difficile pour les bouches des plus jeunes patients
- 3) Il ne peut être utilisé valablement que si les surfaces testées ont été au préalable parfaitement nettoyées
- 4) Ne fait pas la différence entre un émail immature (hypoménéralisé) et un émail déminéralisé
- 5) Toutes les réponses précédentes sont fausses

## 3) L'ostéite actinomycosique :

- 1) Le diagnostic de cette lésion est clinique
- 2) Le diagnostic de cette lésion est radiologique
- 3) Le diagnostic de cette lésion est clinique et radiologique
- 4) La présence de candida albicans confirme le diagnostic
- 5) Toutes les réponses précédentes sont fausses

**ResiDentaire<sup>TM</sup>**

## 4) Lors d'un échec d'une thérapeutique endodontique initiale :

- 1) les bactéries intra canalaire sont identiques à celles qui existaient avant le traitement initial
- 2) les espèces bactériennes dominantes sont des bactéries Gram positif
- 3) les espèces bactériennes dominantes sont des bactéries Gram négatif
- 4) le germe le plus fréquemment observé est Lactobacillus faecalis
- 5) Toutes les réponses précédentes sont fausses

## 5) L'IRS :

- 1) Est la première technique utilisée pour retirer un instrument fracturé
- 2) Inspiré de l'extracteur de Masserat
- 3) Propose des calibres très inférieurs permettant d'être moins Mutilant
- 4) Le blocage du fragment se faisant à l'aide d'une colle à prise rapide
- 5) Toutes les réponses sont justes

## 6) Le retraitement canalaire orthograde :

- 1) Est indiqué dans le cas d'un projet prothétique
- 2) Est indiqué pour des raisons médicales
- 3) Est indiqué devant toute image radio claire
- 4) Est indiqué devant une symptomatologie clinique qui persiste ou apparaît durablement
- 5) Toutes les réponses sont justes

7) Lors d'un retraitement canalaire par voie rétrograde :

- 1) La désinfection et l'obturation de tous le système canalaire reste inférieure par rapport à un retraitement par voie orthograde
- 2) Consiste à traiter et à compléter l'acte sur une section du canal demeuré inaccessible par voie orthograde
- 3) Est indiqué en cas d'une restauration coronaire non étanche
- 4) Le pronostic dépend uniquement de la taille de la lésion
- 5) Toutes les réponses sont justes

8) La fracture d'un instrument dans un canal :

- 1) Son élimination dépend de la nature du canal impliqué
- 2) Son élimination est systématique
- 3) Le bypass est la meilleure technique à employer
- 4) Est à retirer systématiquement devant toute dent présentant une lésion péri-apicale
- 5) Toutes les réponses sont justes

**ResiDentaire<sup>TM</sup>**

Expliquez pourquoi le retraitement canalaire par voie rétrograde ne doit pas être envisagé comme traitement de première intention ?? (02 points)

Continuum Endo-prothétique ?? (02 points)

MTA comme matériel d'obturation à rétro ?? (04 points)

Citez 03 difficultés qui expliquent pourquoi le retraitement canalaire reste un acte complexe ?? (03 points)

**ResiDentaire<sup>®</sup>**