

Choisir la ou les réponses justes :

ResiDentaire<sup>TM</sup>

1- le motif de consultation en odontologie conservatrice :

- a- est souvent pour rétablir l'esthétique
- b- est très rarement pour la douleur
- c- est une partie de l'anamnèse
- d- Nous renseigne sur la vitalité pulpaire
- e- Permet d'évaluer le niveau sociau- économique du patient

END  
1

2- L'histoire de la maladie :

- a- Représente l'évolution de la pathologie dans le temps
- b- Est une partie de l'interrogatoire
- c- Est une partie de l'examen endobuccal
- d- Permet d'éviter les complications locales
- e- Permet d'établir un plan de traitement

OC

2017

3- les signes subjectifs :

- a- Sont tirés à partir de l'histoire de la maladie
- b- Sont indispensables pour poser un diagnostic
- c- Représentent les complications possibles suite à un traitement dentaire
- d- Sont partagés en signe de visu et in situ
- e- Sont obtenus après la réalisation de plusieurs tests

**4- Le test au froid :**

- a- Est un test de vitalité pulpaire
- b- Est un test de proximité pulpaire
- c- Est réalisé avec une boulette de coutant froide ou un bâtonnet de glaçant appliqué au niveau du Colet
- d- Est indiqué en cas de changement de teinte de dent
- e- Est un test qui peut être remplacé par le test de fraisage

**5- Le test de fraisage :**

- a- Est un test de vitalité pulpaire
- b- Est un test réalisé avec une fraise boule montée sur turbine
- c- Est un test qui doit être fait même si le test de froid est positif
- d- Est un test qui renseigne sur la proximité pulpaire
- e- Est un test de stimulation dentinaire direct

**ResiDentaire<sup>TM</sup>**

**6- Le diagnostic différentiel est :**

- a- Une étape faite avant le diagnostic étiologique
- b- Une étape faite avant le diagnostic positif
- c- Un procédé consiste à éliminer les affections qui ont le même tableau clinique
- d- Un procédé consiste à éliminer les affections qui ont partiellement le même tableau clinique
- e- La raison b et d sont juste

**7- Le pronostic :**

- a- Représente une partie du traitement
- b- Destiner à évaluer les possibilités de guérison
- c- Destiner à évaluer le diagnostic
- d- Fait partie du diagnostic différentiel
- e- C'est l'ensemble des pathologies qui ont le même tableau clinique

8 - L'hypersensibilité dentinaire

- a - se caractérise par une douleur brève et aiguë
- b - se caractérise par une douleur longue et aigue
- c - est déclenchée uniquement par le froid et le chaud
- d - est expliquée par un mécanisme pathologique infectieux
- e - est expliquée par une mise a nus de la dentine et ouverture des canalicule dentinaires

9 - L'hypersensibilité dentinaire

ResiDentaire<sup>TM</sup>

- a - nécessite une dentine exposée
- b - nécessite une ouverture des canalicules
- c - les deux processus sont nécessaire dentine exposées et canalicule dentinaire ouverts
- d - généralement concerne une seule dent
- e - est traitée efficacement par l'application des adhésifs

10- La carie de l'email

- a- Peut commencer sur la face occlusale des dents ; carie des sillons
- b- Peut commencer sur la face vestibulaire et palatine ou linguale
- c- est appelée carie de surface lisse quand elle touche les faces vestibulaires ; linguales et proximales
- d- est marquée par une perte de substance cliniquement décelable
- e- est marquée par des modifications de coloration sans perte de substance cliniquement décelable

### 11- la carie de l'email

- a- est une lésion symptomatique
- b- est une lésion asymptomatique
- c- est une lésion qui peut être inaperçue et son dépistage nécessite un examen clinique minutieux
- d- évolue toujours vers la carie arrêtée
- e- toutes les raiponces sont justes

### 12- la carie de la dentine

- a- Est toujours secondaire à la carie de l'email
- b- Est une lésion macroscopiquement faite de Cinque zone
- c- Est classé selon la symptomatologie en lésion rapide ; lente et arrêtée
- d- Est classé selon le mode de progression en lésion superficielle ; profonde et avancée
- e- En absence de traitement évolue toujours favorablement

### 13- la dentinite superficielle

- a- Est une cavité de moins de 2mm
- b- Caractérisé par une douleur localisée de courte durée
- c- Est stimulé par le froid et le chaud
- d- Ne répond pas au test de pression
- e- Nécessite un traitement invasif



14 - la dentinite profonde

- a- Est une cavité de moins de 2mm
- b- Est caractérisée par une douleur provoquée localisée
- c- Est caractérisée par les cernes laiteux de marmasse
- d- Est stimulée uniquement par les acides et les sucres
- e- Elle ne répond pas au test de pression

15- La dentinite avancée

- a- Est une lésion dont la cavité est volumineuse
- b- Est caractérisé par les cernes laiteux de marmasse
- c- Est stimulé par la variation thermique ; les acides et le sucre
- d- Répond au test de pression
- e- Ne répond pas au test de pression

16- la carie a évolution rapide

- a- Est une lésion aigue
- b- Est une lésion chronique
- c- Caractérisé par une cavité qui contient beaucoup de dentine ramollie
- d- Nécessite un traitement dentinaire simple
- e- Se traite toujours par un coiffage

17- la carie à évolution lente

- a- Est une lésion aigue *chronique*
- b- Est caractérisée par une cavité qui contient beaucoup de dentine ramollie
- c- Est caractérisée par une cavité qui contient beaucoup de dentine réactionnelle
- d- Est marquée par les cernes laiteux de marmasse
- e- Répond au test de pression



### 18- le coiffage juxta-pulpaire

a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à un médicament placer sur une plaie vive de la dentine

b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié

c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une pulpe dénudée

d- Est indiqué pour les caries à évolution lente

e- Est indiqué si test de proximité pulpaire est positif

### 19- le coiffage dentinaire

a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une plaie vive de la dentine

b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié

c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteusesur une pulpe dénudée

d- Est indiqué pour les caries à évolution lente

e- Est indiqué pour les caries de dentine à évolution rapide

**ResiDentaire<sup>TM</sup>**

### 20- le coiffage pulpaire direct

a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une plaie vive de la dentine

b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié

c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une pulpe dénudée

d- Est indiqué pour les caries à évolution lente

e- Est indiqué pour les caries à évolution rapide sans exposition pulpaire