

Choisir la ou les réponses justes :

1- *La conicité majorée des instruments Ni-Ti permet*

- a- D'augmenter la capacité de coupe de l'instrument
- b- De réduire la surface de contact avec les parois canalaire
- c- D'augmenter le nombre d'instruments utilisés
- d- De réduire le risque de fracture
- e- Toutes les réponses sont justes

2- *Une nouvelle gamme d'instruments rotatifs a été mise au point, elle s'appuie sur :*

- a- L'utilisation du Ni - Ti
- b- L'abandon de la norme ISO
- c- Modification de la pointe
- d- Modification des conicités
- e- Toutes les réponses sont justes

3- *Le NI-TI est caractérisé par :*

- a- La super élasticité
- b- La mémoire de forme
- c- La flexibilité
- d- L'efficacité de coupe
- e- Toutes les réponses sont justes



4- Le traitement préventif de la carie consiste à

- a- Eliminer la plaque dentaire par brossage
- b- Conseiller la consommation de lait
- c- Evaluer le risque cariogène
- d- Dépister la carie à un stade de déminéralisation
- e- Toutes les réponses sont justes

5- La cavité d'accès d'une première molaire inférieure doit être

- a- trapézoïdale dont la petite base est en distale et la grande est en mésiale
- b- trapézoïdale dont la petite base est en mésiale et la grande est en distale
- c- trapésoïdale si la dent a trois racines
- d- Triangulaire à base distale et pointe mésiale
- e- Triangulaire à base mésiale et pointe distale

6- Une première molaire supérieure possède

- a- Un canal palatin et deux vestibulaires
- b- Un canal palatin et trois vestibulaires
- c- Deux canaux palatins et deux vestibulaires
- d- Deux racines une palatine et une vestibulaire
- e- Trois racines deux vestibulaires et une palatine



**7- Après obturation canalaire d'une dent vous constatez un manque à quoi cela peut être dû**

- a- Pâte d'obturation canalaire de mauvaise qualité
- b- Une mauvaise estimation de la longueur de travail
- c- Formation de bouchon dentinaire
- d- Cône de gutta plié
- e- Instrument cassé

**8- La douleur de la dentinite avancée est**

- a- Provoquée
- b- Spontanée
- c- Calmée par le froid
- d- calmée par le chaud
- e- Accentuée par le décubitus

**9- Lorsqu'on fait la cavité d'accès on cherche**

- a- Les canaux principaux et secondaires
- b- Les entrées canalaires
- c- La chambre pulpaire
- d- L'apex
- e- A déterminer la longueur de travail



## 10- La carie de l'email

- a- Peut commencer sur la face occlusale des dents ; carie des sillons
- b- Peut commencer sur la face vestibulaire et palatine ou linguale
- c- est appelé carie de surface lisse quand elle touche les faces vestibulaires ; linguales et proximales
- d- est marqué par une perte de substance cliniquement décelable
- e- est marqué par des modifications de coloration sans perte de substance cliniquement décelable

## 11- la carie de l'email

- a- est une lésion symptomatique
- b- est une lésion asymptomatique
- c- est une lésion qui peut être inaperçue et son dépistage nécessite un examen clinique minutieux
- d- en absence évolue toujours vers la carie arrêtée
- e- toutes les raiponces sont justes

## 12- la carie de la dentine

- a- Est toujours secondaire à la carie de l'email
- b- Est une lésion macroscopiquement faite de Cinque zone
- c- Est classé selon la symptomatologie en lésion rapide ; lente et arrêtée
- d- Est classé selon le mode de progression en lésion superficielle ; profonde et avancée
- e- En absence de traitement évolue toujours favorablement



**13- la dentinite superficielle**

- a- Est une cavité de moins de 2mm
- b- Caractérisé par une douleur localisée de courte durée
- c- Est stimulé par le froid et le chaud
- d- Ne répond pas au test de pression
- e- Nécessite un traitement invasif

**14 - la dentinite profonde**

- a- Est une cavité de moins de 2mm
- b- Est caractérisée par une douleur provoquée localisée
- c- Est caractérisée par les cernes laiteux de marmasse
- d- Est stimulée uniquement par les acides et les sucres
- e- Elle ne répond pas au test de pression

**15- La dentinite avancée**

- a- Est une lésion dont la cavité est volumineuse
- b- Est caractérisé par les cernes laiteux de marmasse
- c- Est stimulé par la variation thermique ; les acides et le sucre
- d- Répond au test de pression
- e- Ne répond pas au test de pression





**16- la carie a évolution rapide**

- a- Est une lésion aigue
- b- Est une lésion chronique
- c- Caractérisé par une cavité qui contient beaucoup de dentine ramollie
- d- Nécessite un traitement dentinaire simple
- e- Se traite toujours par un coiffage

**17- la carie à évolution lente**

- a- Est une lésion aigue
- b- Caractérisée par une cavité qui contient beaucoup de dentine ramollie
- c- Caractérisée par une cavité qui contient beaucoup de dentine réactionnelle
- d- Marquée par les cernes laiteux de marmasse
- e- Répond au test de pression

**18- le coiffage juxta-pulpaire**

- a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à un médicament placer sur une plaie vive de la dentine
- b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié
- c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une pulpe dénudée
- d- Est indiquée pour les caries à évolution lente
- e- Est indiquée si test de proximité pulpaire est positif



### **19- le coiffage dentinaire**

- a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une plaie vive de la dentine
- b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié
- c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une pulpe dénudée
- d- Est indiquée pour les caries à évolution lente
- e- Est indiquée pour les caries de dentine à évolution rapide

### **20- le coiffage pulpaire direct**

- a- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une plaie vive de la dentine
- b- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur un opercule de dentine décalcifié
- c- Est une intervention médicale chirurgicale qui consiste à placer une substance médicamenteuse sur une pulpe dénudée
- d- Est indiquée pour les caries à évolution lente
- e- Est indiquée pour les caries à évolution rapide sans exposition pulpaire