

*Triki Selma Amel*

-Cocher la ou les réponses justes

1-La chirurgie est indiquée lorsque la tubérosité :

- A-dépasse le plan d'occlusion.
- B-Gené le montage.
- C-Touche la crête inférieure.
- D-distante du plan d'occlusion.

2-La chirurgie est indiquée lorsqu'une contre dépouille :

- A-Empêche un joint périphérique hermétique.
- B-Empêche l'insertion et désinsertion de la prothèse.
- C-Constituée de tissu fibro-conjonctifs dense.
- D-Constituée d'un tissu osseux recouvert d'un tissu mince.

3. Mouillabilité est représentée par:

- A- le degré d'étalement d'un liquide sur la surface d'un solide.
- B-Il s'exprime par l'angle de raccordement du liquide avec le solide.
- C-l'angle de raccordement aigu.
- D-l'angle de raccordement obtus.

4-Les barres en prothèse supra:

- A- peuvent être de type ovoïde, ronde ou rectiligne..
- B-Les positions retenues sont les latérales ou les canines
- C-La rétention de prothèse Totales est assurée par des cavaliers
- D- repartit des charges entre les implants.

5- modelage buccinateur en piezographie.

- A-répéter les phonèmes ~~SIR~~ 6 fois et SO une fois.
- B-répéter les phonèmes SIS 6 fois et SOU une fois.
- C-répéter les phonèmes SIS 6 fois et SO une fois.
- D-répéter les phonèmes ~~SIR~~ 6 fois et SOU une fois.

6-lors du modelage piezographique ,la résine a prise retardée est appliquée :

- A-sur intrados.
- B-Sur extradados et intrados.
- C-Intrados,bords et extradados
- D-Sur extradados

7-Détermination du pop piezographique :

- A-parallèle au plan de camper postérieurement.
- B-se situe à la jonction muqueuse papillée , muqueuse lisse de la langue au repos.
- C-parallèle au fond du sillon imprimé par les fibres horizontales du buccinateur.
- D-parallèle au fond du sillon imprimé par les fibres horizontales du masséter.

8-technique de déglutition piezographique inf :

- A-maquette sup est placé en bouche.
- B-Elle constitue la fonction orale la moins affectée par la perte des organes dentaires
- C-le maxillaire est libre de toute maquette ou prothèse.
- D-Indiquée chez sourds ou muets.

9-les bases souples trouvent leurs indications :

- A- lorsque le patient est traité par chimio ou radiothérapie
- B- Ligne oblique interne saillante.
- C- Lors d'un traitement par une prothèse complète immédiate.
- D-DV sous évaluée de l'étage inférieur.

10-la prothèse supra-radulaire ou supra-implantaires

- A-Utilise des implants reliés par des barres.
- B-Des racines et implants reliés par des barres.
- C-Des racines reliées par des barres.
- D-Toutes les réponses sont fausses.

11- La Prothèse immédiate :

- A - Insérée le jour de l'extraction.
- B - Nécessite un os alvéolaire resorbé.
- C - Nécessite prescription des ATB et AINS.
- D - Inséré après 24h de la dernière extraction.

12- La mise en condition est indiquée :

- A - Un patient qui jamais été appareillé.
- B - Patient appareillé de façon erronée.
- C - Patient avec pathologie à caractère évolutif.
- D - Utilise la résine auto polymérisable.

13 - La mise en condition utilise :

- A - La prothèse d'usage du patient.
- B - Une duplicata.
- C - La résine auto polymérisable.
- D - La résine molle.

14 - Transfert de la résine a prise retardée est réalisé pendant :

- A - La phase de plastique.
- B - La phase élastique.
- C - Phase de gel.
- D - Phase sablineuse.

15- Une cuspid de valeur primaire est meulée lorsqu'elle gêne :

- A - Les contacts en latéralités.
- B - Les contacts en propulsion.
- C - Les contacts en relation centrée.
- D - Les contacts en latéralités ET en propulsion

16 - Des nausées secondaire lors de l'insertion sont dues aux :

- A - Mobilité de la prothèse supérieure.
- B - Arcade inferieure étroite.
- C - Dvo sur évaluée.
- D - plan d'occlusion mal orienté.

17- le guide chirurgical en prothèse immédiate :

- A - réalisé en bouche en résine auto transparente.
- B - réalisé au labo en résine auto transparente.
- C - réalisé en bouche le jour de l'insertion.
- D - Réalisé au labo sur une empreinte totale post extractionnel.

18 - En latéralité, le meulage s'effectue :

- A - Du coté non travaillant, il s'effectuera aux dépens de versants internes mésiaux des cuspides actives inférieures et aux dépens de versants distaux internes des cuspides actives supérieures. MIVI DISS
- B - Du coté travaillant, il s'effectuera aux dépens de versants internes mésiaux des cuspides actives inférieures et aux dépens de versants distaux internes des cuspides actives supérieures.
- C - Du coté non travaillant, il s'effectuera aux dépens de versants internes distaux des cuspides actives inférieures et aux dépens de versants mésiaux internes des cuspides actives supérieures.
- D - Du coté travaillant, il s'effectuera aux dépens de versants internes distaux des cuspides actives inférieures et aux dépens de versants mésiaux internes des cuspides actives supérieures.

19 - Equilibration de la propulsion au niveau postérieur :

- A - Aux dépens de versants distaux des cuspides vestibulaires inférieures. DI
- B - aux dépens de versants mésiaux des cuspides linguales supérieurs. MS
- C - Aux dépens de versants distaux des cuspides vestibulaires supérieurs. DS
- D - aux dépens de versants mésiaux des cuspides linguales inférieures. MI

20 - Le Rebasage est indiqué en cas de :

- A - Dvo sous-évaluée.
- B - Dvo sus évaluée.
- C - Prothèse poreuse.
- D - Plan d'occlusion mal orienté.

ResiDentaire™