Hygiène et Prévention 1-1 e second groupe des germes pathogènes comporte : a. Les germes de la tuberculose b- Les germes de l'hépatite A d- Les staphylocoques aureus, les streptocoques pyogènes c- La flore commensale 2-La contamination parentérale: a- Peut être directe # b- Est une contamination aérienne d- Se fait par le biais d'une aiguille souillée par le sang# c- Peut être indirecte # 3-Le facteur scientifique en ergonomie : b- La totalité de l'équipe de stomatologie a- Comporte la conception # 4-Les paramètres ergonomiques de l'espace de travail sont: a- La lumière ou chromatique PLATFORME 5-La dentisterie communautaire a pour objectifs: RESIDENTAIRE QCM Médecine Dentaire a- La promotion de la santé 6-Dans la démarche communautaire, le praticien réalise b- une enquête épidémiologique a- un examen clinique 7-Les outils de la dentisterie communautaire sont : 8-Dans la pratique de la dentisterie communautaire: b- le problème doit toucher plusieurs individus a- le problème doit toucher un individu la solution est applicable de façon individuelle d- la solution est applicable de façon collective a-qui permet de tuer les microorganismes 9-la stérilisation est une opération de l'instrume de l'instrume Lani nermet d'éliminer les bactéries

10-Le Tri des déchets permet

- a-d'assurer la sécurité des personnes
- b- de respecter les règles d'hygiène
- o-d'éliminer chaque type de déchet par la filière
- d-d'éviter la contamination des personnes

l 1-La santé bucco-dentaire se caractérise par :

- a- Des lésions buccales
- b- Des déchaussements
- c- Des pertes de dents
- d- D'autres maladies et troubles limitant la capacité de mordre, mâcher.....

12-Les études les plus récentes ont montrés que les parodontites pourraient être associées à ;

- Un risque augmenté de maladies cardiovasculaires b-De maladies broncho-pulmonaires
- D'accouchement prématuré C-
- d-

D'hypertension pendant la grossesse (pré-éclampsie) 13- Les fluorures, en phase post-éruptive :

PLATFORME -

- limitent la déminéralisation
- favorisent la reminéralisation
- c- inhibent le métabolisme des bactéries cariogènes
- d- Toutes les réponses sont justes

QCM Médecine Dentaire

RESIDENTAIRE

14-La fluorose dentaire :

- a- Est due à un surdosage en fluor pendant plusieurs mois et années
- b- Est due à une diminution de la quantité de fluorures dans le tissu dentaire
- c- se manifeste par des taches opaques blanches plus au moins étendues sur la dentine
- d- toutes les réponses sont justes

15-Selonles recommandations cliniques d'utilisation des fluorures par les dentistes :

- a- Les personnes à risque élevé de carie dentaire sont uniquement les personnes qui r brossent pas les dents avec un dentifrice fluoré
- b- Les patients présentant un faible risque carieux ne doivent pas bénéficier d'appli topiques professionnelles de fluorures
- c- Les enfants à risque élevé doivent bénéficier d'applications de fluor à des inte 3 à 6 mois
- d- Les vernis fluorés contiennent une quantité plus importante de fluor compar aux gels fluorés

16- Un consensus au sein de la communauté scientifique (OMS) a permis d'étal recommandations suivantes:

- a- une exposition quotidienne et fréquente à de taux importants de fluorures
- b- les apports doivent être réguliers, en particulier sous forme de dentifric

d- D'autres de dents	
d- D'autres de dents 12-Les études les plus récentes ont en la capacité de mordre, mâcher	
12-Les études les la capacité de mordre, mâcher	
De maladies broncho-pulmonaires D'accouchement prématuré D'hypertension pendant la grossesse (pré-éclampsie) Les fluorures, en phase post-éruptive: D'ATFORME PLATFORME PLATFORME	
d- Toutes les réponses sont justes 4-La fluore	
4-1 a g	
4-La fluorose dentaire : QCM Médecine Dentaire	
a- Est due à un surdosage en fluor pendant plusieurs mois et années b- Est due à une diminution de la quantité de fluorures dans le tissu dentaire c- se manifeste par des taches opaques blanches plus au moins étendues sur la dentine	
-Selonles reco	
recommandations cliniques d'utilisation des 5	
 a- Les personnes à risque élevé de carie dentaire sont uniquement les personnes qui ne se brossent pas les dents avec un dentifrice fluoré b- Les patients présentant un faible risque carieux ne doivent pas bénéficier d'application topiques professionnelles de fluorures c- Les enfants à risque élevé doivent bénéficier d'applications de fluor à des intervall 3 à 6 mois d- Les vernis fluorés contiennent une quantité plus importante de fluor comparative aux gels fluorés 	or le
n consensus au sein de la communauté scientifique (OMS) a permis d'établir amandations suivantes :	10
fréquente à de taux importants de fluorures aux	a
une exposition quotidienne et fréquente à de taux importants de fluorures aux meilleure action les apports doivent être réguliers, en particulier sous forme de dentifrices Conseils hygiéno-diététiques (alimentation fibreuse, riche en protéines et en glucides) et visites régulières chez le médecin dentiste Toutes les réponses sont justes	

17-L'étude de prévalence :

- a- -Est une étude à visée analytique.
- b- -Est une enquête transversale
- c- Nécessite le suivi des patients dans le temps

18-Le Tri des déchets permet

- a- d'assurer la sécurité des personnes
- b- de respecter les règles d'hygiène
- c- d'éliminer chaque type de déchet par la filière
- d-d'éviter la contamination des personnes

19-Le choix d'un antiseptique est fonction de :

- a- Son efficacité sur l'ensemble des micro-organismes
- b- sa tolérance
- c- sa vitesse d'action
- d-Toutes les réponses sont justes

20- les objectifs du contrôle des infections sont : a- la Protection des patients et le personnel contre les infections

b-la réduction du nombre de micro-organismes parhogènes pour permettre un système in

de prévenir les infections

c- l'élimination de la contamination croisée

d-toutes les réponses sont justes

