

## Cochez La ou les réponses justes

### 1. Les muscles masticateurs :

- Représentent les muscles du mouvement de fermeture buccale
- Dont le temporal est un propulseur
- Doivent être en équilibre avec les muscles élévateurs pour que la mandibule occupe une position de repos
- Sont au nombre de 4, dont les ptérygoidiens externe et interne sont des diducteurs grâce à une contraction unilatéral.
- Toutes les réponses sont justes

### 2. L'articulation temporo-mandibulaire :

- Est l'une des articulations les plus complexes du corps humain
- Est celle qui a le moins de capacité d'adaptation
- Dispose de 2 sous-articulations au sein de la même articulation
- Offre deux mouvements élémentaires ; la rotation et la translation
- Permet à la mandibule d'effectuer des mouvements de 3 degrés de liberté

### 3. L'enveloppe des mouvements limites :

- Représente tous les mouvements para fonctionnels responsable d'un dysfonctionnement articulaire
- Inclue les mouvements lors de la mastication et lors de la phonation
- Regroupe des mouvements qui s'effectuent dans les 3 plans de l'espace
- Conditionnée par une propulsion et une retropulsion extrêmes, des diductions maximales et une ouverture orale complète
- Représentée par le schéma de Posselt et l'arc de Gysi.

### 4. Le bruxisme du sommeil :

- est répertorié comme trouble du sommeil
- est répertorié comme pathologie inflammatoire
- comprend des épisodes de serrement des dents
- comprend des épisodes de grincement des dents
- toutes les réponses sont justes

PLATFORME  
**RESIDENTAIRE**

QCM Médecine Dentaire

10- Il est recommandé de transférer un modèle maxillaire , sur articulateur semi adaptable par :

- a. une table de montage
- b. un arc facial
- c. une programmation des boîtiers condyliens
- d. un enregistrement de la DVO.
- e. l'enregistrement de la relation centrée

PLATFORME

**RESIDENTAIRE**

QCM Médecine Dentaire

11-La programmation de l'articulateur :

- a. Est la première étape de la mise en articulateur
- b. Consiste en un transfert de la pente condylienne, ainsi que de l'angle de Bennett
- c. Est arbitraire sur un articulateur semi adaptable
- d. S'effectue à l'aide de cire de protrusion , de diduction droite et gauche
- e. S'effectue à l'aide de la table de montage

12-L'intérêt d'un articulateur semi adaptable est :

- a. De détecter certaines malocclusions
- b. Simuler la véritable cinématique mandibulaire
- c. De détecter une perturbation du plan d'occlusion
- d. De Permettre de travailler sur une position statique fixe
- e. De Reproduire le déplacement para fonctionnel

13-L'articulateur programmable permet de reproduire :

- a. l'intégralité des mouvements fonctionnels
- b. les mouvements Sans le trajet intermédiaire
- c. le déplacement latéral immédiat
- d. les mouvements para fonctionnels

14- Le transfert du modèle mandibulaire sur articulateur semi adaptable s'effectue

- a. Après enregistrement de la position d'intercuspidation maximale
- b. Après enregistrement de la relation centrée
- c. Après enregistrement des mouvements excentrés
- d. Après un pré-réglage de l'articulateur
- e. A l'aide d'un arc facial

5. L'équilibre du système manducateur peut être rompu par :

- a. un problème occlusal
- b. un problème postural
- c. un problème musculaire
- d. un problème psychologique
- e. un problème iatrogène

— P L A T F O R M E —

## RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

6. Le rôle propriocepteur est une caractéristique du :

- a. Parodonte profond
- b. Parodonte superficiel
- c. Des muscles élévateurs
- d. De la muqueuse orale
- e. De la pulpe dentaire

7. En intercuspitation maximale :

- a. Les cuspides secondaires maintiennent la dimension verticale
- b. Il existe un surplomb molaire d'environ 1mm
- c. Il existe un surplomb incisif d'environ 2 à 3 mm, avec contact dentaire
- d. Ce sont les cuspides primaires qui participent aux mouvements excentrés
- e. Résulte d'une position de référence articulaire

8. Le plan d'occlusion

- a. est agencé selon la sphère de Monson
- b. est transféré sur articulateur par l'intermédiaire d'un arc facial
- c. est souvent perturbé face à un edentement non compensé
- d. possède un rôle esthétique et fonctionnel
- e. toutes les réponses sont justes

9. L'embrasure occlusale :

- a. est situé au dessus du point de contact proximal
- b. peut entrer en contact avec une embrasure occlusale antagoniste
- c. située au niveau du tiers cervical de 2 dents adjacentes
- d. préserve la papille gingivale
- e. reçoit une cuspide dans le cas où une dent entre en contact avec deux dents antagonistes