

Cochez la ou les réponses justes :

- ✓ 1/ La dent est dite en gression lorsque :
- A- Elle se verse lingualement ✗
 - B- La couronne et la racine se versent dans une direction opposée ✗
 - ✓ C- Elle se déplace parallèlement à elle-même en direction axiale
 - D- La racine se déplace en direction vestibulaire ✗
- ✓ 2 / L'étage inférieur de la face :
- A- Est appelé étage maxillaire ou respiratoire ✗
 - B- S'étend de la ligne bi-ophriaque a la ligne sous nasale
 - ✓ C- Est dit étage mandibulaire ou digestif
 - D- S'étend de la ligne sous nasale à la ligne sous mentonnière
- ✓ 3 / L'âge de 10-12 ans correspond à l'âge moyen de l'éruption des :
- A- Premières prémolaires supérieures
 - ✓ B- Premières prémolaires inférieures
 - C- Deuxièmes prémolaires supérieures
 - D- Canines inférieures
- ✓ 4 / Dans la retrocusie l'overjet peut être :
- A- Inférieur à 2mm
 - ✓ B- Négatif
 - C- Supérieur à 2mm
 - D- Nul
- ✓ 5 / En présence d'une classe III d'Angle la première molaire inférieure est :
- A- En mésioclusion par rapport à la supérieure
 - ✓ B- En distoclusion par rapport à la supérieure
 - C- En distoclusion avec vestibulo version des incisives supérieures
 - D- Est mésialée d'une demi-cuspide par rapport à la supérieure ✗
- ✓ 6/ En présence des données suivantes : ANB augmenté (supérieur à 4°) et SNA = 85° le diagnostic est :
- A- un décalage de base osseuse dans le sens d'une rétromandibulie ✗
 - B- une harmonie des bases osseuse ✗
 - ✓ C- une classe 2 squelettique
 - D- un décalage de bases dans le sens d'une rétromaxillie ✗
- ✓ 7 / L'analyse de Nance : DDM
- A- Permet le calcul de la dysharmonie dento-dentaire aux deux arcades.
 - ✓ B- Permet le calcul du manque ou excès de place sur l'arcade dentaire.
 - C- Nécessite l'utilisation du tableau de Château.
 - D- Peut s'effectuer en utilisant la radiographie panoramique ✗
- 8/ L'utilisation de l'arc incisif est indiquée dans le calcul :
- A- de la longueur de base maxillaire
 - ✓ B- de la DDM en denture permanente
 - C- de la DDM en denture mixte
 - D- de l'indice d'Izard
- ✓ 9 / L'Indice d'Izard :
- A- Donne un diagnostic osseux dans le sens sagittal. ✗
 - B- Donne un diagnostic alvéolaire dans le sens transversal. ✗
 - ✓ C- Est calculé à partir de la distance bitygomatique cutanée.
 - D- Permet de diagnostiquer une éventuelle endo ou exognathie maxillaire.
- ✓ 10 / La largeur maximale de l'arcade maxillaire est mesurée :
- //A- Entre les faces vestibulaires des premières molaires permanentes.
 - ✓ B- Entre les faces vestibulaires des molaires les plus écartées.
 - //C- Entre les deux tubérosités maxillaires
 - D- Entre les centres des sillons des premières molaires pour le D6G6.

8313 [80.86]
class II SN A 51 ans Aich.
6 ans
mandibule



→ A44(P10) 5
A
Aicham

10 46
12 49 VPR endo
15 52 VP > endo
16 52

- ✓ 11 / La longueur de Base Maxillaire :
 - A- Se mesure du point A de Downs à la face distale de la dent de 6 ans
 - B- Donne un diagnostic osseux dans le sens transversal
 - ✓ C- Se mesure sur moulages ou téléradiographie de profil
 - D- Dépend de l'âge civil du patient
- ✓ 12 / Un enfant de 9 ans ayant une longueur de base maxillaire égal à 53mm présente :
 - A. Une rétrognathie
 - B. Une prognathie
 - ✓ C. Une dolichognathie
 - D. Une brachymandibulie
- ✗ 13 / Les mesures de D4 G4 et D6 G6 :
 - A- Sont les indices arcades dents de Pont ✓
 - B- Déterminent le diagnostic des anomalies basales du sens transversal
 - ✓ C- Permettent le diagnostic des anomalies alvéolaires du sens transversal ✓
 - D- Comparent les distances inter prémolaires et inter zygomatiques
- ✓ 14 / D4G4 mesuré : 29,1mm et D4G4 sur le tableau de Château : 34,5mm on parle d'une :
 - ✓ A- Endoalveolie antérieure
 - B- Exoalveolie antérieure
 - C- Endognathie antérieure ✗
 - D- Endoalveolie postérieure ✗
- ✓ 15 / La Téléradiographie de profil strict :
 - A- Donne un diagnostic osseux dans le sens sagittal et transversal.
 - B- Apprécie les rapports des bases maxillaires grâce à l'angle facial (AF)
 - ✓ C- Donne le type squelettique du patient dans le sens sagittal et vertical.
 - D- Est un examen complémentaire de première intention
- 16 / La radiographie panoramique :
 - A- Donne une vue partielle du maxillaire et de la mandibule
 - ✓ B- Permet d'observer les alveolyses verticales ou horizontales
 - C- Permet de calculer une dysharmonie dento maxillaire
 - ✓ D- Visualise l'ATM droite et gauche
- 17 / Le Crochet Adams :
 - ✓ A- Est un crochet de rétention ✓
 - B - Est réalisé en fil d'acier 0,6 mm ✗
 - ✓ C- Permet de réaliser un mouvement de version sur les prémolaires
 - ✓ D- Est parfois réalisable sur les molaires lactéales
- 18 / L'arc vestibulaire réalisé avec du fil 0,6 mm :
 - ✓ A- Est un moyen d'action ✓
 - ✓ B- Permet le recul des canines
 - ✓ C- Permet l'expansion des arcades
 - ✓ D- Corrige la proalveolie ✓
- ✓ 19 / Le rétracteur de Canine :
 - ✓ A- Est un élément actif
 - ✓ B- Permet la correction d'une ectopie canine légère
 - ✓ C- Est utilisé pour la fermeture d'un diastème post canin //
 - D - Est un élément passif Adams / Sims / canin -
- 20 / Le ressort de Schwartz :
 - ✓ A- Est indiqué pour la correction de la palato version d'une dent
 - ✓ B- Est indiqué pour vestibulo verser 2-3 ou 4 incisives supérieures
 - ✓ C- Est un élément actif du dispositif amovible
 - D - Est constitué d'un 1 arc actif, de 4 spires, et de 2 bras actifs

As élémb
ray

