

NOM : PRENOMS : AMPHI (SALLE) :

Cochez UNE ou PLUSIEURS réponse(s) :

ResiDentaire®

1. La gémération :

- a. Est une dysmorphie coronaire.
- b. Est le déplacement de la dent au sein du maxillaire.
- c. Est l'union de deux germes dentaires. ✓
- d. Peut être confondu avec la fusion. ✓

2. Parmi les contre-indications des vasoconstricteurs :

- a. Hémophilie. ✓
- b. Femme enceinte. ✓
- c. Diabète équilibré. ✗
- d. Tumeur de la médullo-surrénale.

3. Pour les conseils post-opératoires, il faut prescrire :

- a. Les bains de bouche pendant 24 heures, afin d'accélérer la cicatrisation muqueuse.
- b. Une alimentation chaude le premier jour.
- c. Un antalgique type salicylé pour diminuer les douleurs post-extractionnelles.
- d. Toutes les réponses sont fausses. ✓

4. Lors de la luxation :

- a. Il faut mobiliser la dent dans son alvéole en prenant appui sur la dent voisine.
- b. Le maintien des tables osseuses est nécessaire. ✓
- c. L'opérateur se place devant et à gauche du patient pour les dents maxillaires.
- d. L'instrument utilisé est un élévateur tenu à plein main. ✓

5. La chute prématurée des dents temporaires :

- a. Est due au développement précoce du germe d'une dent permanente. ✓
- b. Est généralement associée à des pathologies générales telles que le Chénubisme. ✓
- c. Concerne préférentiellement les canines maxillaires, l'incisive latérale maxillaire.
- d. Concerne l'ensemble des dents temporaires.

6. La dilacération :

- a. Est une anomalie de structure héréditaire dont la transmission se fait selon un mode autosomique dominant.
- b. Peut être confondue avec le taurodontisme.
- c. Survient quand un traumatisme mécanique affecte une dent temporaire et se répercute au niveau du germe définitif. ✓
- d. Est une dysmorphie coronaire. ✓

7. L'inclusion des dents permanentes est généralement due à :

- a. Une anomalie de croissance de l'os alvéolaire. ✓
- b. Une évolution d'une maladie carieuse.
- c. La présence d'un odontome ou dents surnuméraires. ✓
- d. Toutes les réponses sont justes.

8. L'instrumentation nécessaire pour l'avulsion dentaire simple est :

- a. Le syndesmotome. ✓
- b. Le bistouri.
- c. Le décolleur.
- d. La pince gouge.

9. Le cabinet dentaire doit être équipé :

- a. D'un autoclave de classe S.
- b. D'un autoclave de classe B. ✓
- c. D'un poupinel.
- d. D'un stérilisateur ultrasonique.

✓ 10. La manœuvre de Velpeux est pratiquée devant :

- a. Une avulsion d'une dent antérieure ✓
- b. Une avulsion dentaire faite au maxillaire ✓
- c. Toute extraction dentaire.
- d. Une sinuïte maxillaire d'origine dentaire ✓

✓ 11. Parmi ses propositions, laquelle(s) est(sont) juste(s) :

- a. La pré-désinfection a pour but d'éviter le séchage des saillies sur le matériel. ✓
- b. Le nettoyage assure l'élimination de toute forme microbienne.
- c. Le traitement requis en soins 1 est un blanchiment quotidien.
- d. Le conditionnement des dispositifs médicaux n'est nécessaire que si la stérilisation se fait par la chaleur sèche.

12. Lors de phénomènes inflammatoires, le milieu dans lequel on injecte le produit anesthésique est déjà acide, le produit est donc :

- a. Immédiatement actif.
- b. Immédiatement diffus.
- c. Ne diffuse pas. ✓
- d. Non ionisé. ✓

✓ 13. La projection d'une dent de sagesse supérieure dans le sinus maxillaire :

- a. S'accompagne d'une communication bucco-sinusienne. ✓
- b. Se traduit cliniquement par une hyposthésie de la région naso-génienne. ✓
- c. Fait suite à une manœuvre de luxation mal contrôlée. ✓
- d. Nécessite une abstention thérapeutique en raison de la complexité des suites post-opératoires.

✓ 14. L'avulsion d'une dent de lait est indiquée, si :

- a. Elle est à l'origine d'une paralysie. ✓
- b. Elle siège sur le trait de fracture. ✓
- c. Elle est cariée.
- d. La dent permanente est absente.

PLATFOME

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

✓ 15. L'anesthésie de surface est :

- a. Indiquée en cas d'un drainage exobuccal.
- b. Peut être utilisée au niveau cutané.
- c. Généralement commercialisée sous formes de cartouches de 1.8ml. ✓
- d. Suffit pour l'avulsion des dents de lait. ✓

16. Le davier utilisé pour l'extraction de la 1^{ère} molaire supérieure comporte des :

- a. Mors symétriques, égaux, jointifs.
- b. Mors symétriques, égaux, sous forme de S allongé.
- c. Mors asymétriques avec un ergot médian qui vient s'insérer dans la forcation vestibulaire. ✓
- d. Mors larges et longs, sans ergot médian.

✓ 17. L'anesthésie intra-ligamentaire :

- a. Consiste à infiltrer la solution analgésique dans le desmodonte. ✓
- b. Est indiquée pour l'extraction des molaires.
- c. Est parfois utilisée en complément d'une anesthésie para-apicale. ✓
- d. Toutes les réponses sont fausses.

✓ 18. La dentinogénèse imparfaite :

- a. Est toujours associée à des signes généraux.
- b. Est souvent confondue avec l'amélogénèse imparfaite. ✓
- c. Affecte les deux dentures à des degrés différents. ✓
- d. Est une anomalie de structure où seules les couronnes dentaires présentent une altération.

19. Les accidents allergiques immédiats liés aux anesthésiques locaux :

- a. Sont fréquents. ✓
- b. Sont souvent dus aux conservateurs et aux stabilisants présents dans la cartouche.
- c. Se voient surtout avec les molécules amino-esters. ✓
- d. Toutes les réponses sont justes.

✓ 20. L'éruption dentaire :

- a. Est un processus unifactoriel.
- b. Est un processus biologique qui se termine dès l'émergence de la couronne dans la cavité buccale.
- c. Est un processus biologique par lequel une dent en développement émerge à travers l'os et la muqueuse orale. ✓
- d. Fait partie intégrante de la croissance cranio-faciale. ✓



UNIVERSITE D'ALGER 1
FACULTÉ DE MEDECINE

Epreuve de Pathologie 2ème - année Médecine Dentaire Rattrapage- 2023/2024

Date de l'épreuve : 25/06/2024

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	D	1
2	D	1
3	D	1
4	BD	1
5	AB	1
6	C	1
7	AC	1
8	A	1
9	B	1
10	A	1
11	A	1
12	AC	1
13	AC	1
14	AB	1
15	AB	1
16	C	1
17	AC	1
18	C	1
19	BC	1
20	CD	1



Dr. SAÏDI K.

Maître-Assistant en Pathologie
et Chirurgie Buccales