



Cochez la ou les r  ponses justes



1. Lors de la r  daction d'une ordonnance Hi  rarchiser une prescription veut dire :
 - a- Aller du traitement le plus important au moins important
 - b- Aller du traitement le moins important au le plus important
 - c- Aller du traitement le moins nephrotoxique au plus nephrotoxique
 - d- Aller du traitement le plus indispensable au moins indispensable
 - e- Archiver l'ordonnance pour une bonne tra  abilit  
2. Lors de l'administration des m  dicaments par voie orale chez le sujet   g   la r  sorption :
 - a- Est peu modifi  e
 - b- Est tr  s modifi  e en fonction de l'  ge
 - c- La r  sorption n'est pas du tout modifi  e
 - d- Est tr  s diminu  e en raison de l'intol  rance digestive li  e    l'  ge
 - e- Est en fonction de la concentration du m  dicament
3. Lors de l'administration des m  dicaments par voie orale chez le sujet   g   l'alt  ration de la distribution :
 - a- Est significative
 - b- Est due    la r  duction de la concentration des prot  ines plasmatiques
 - c- Est due    l'augmentation de la concentration des prot  ines plasmatiques
 - d- N'est pas significative
 - e- Est due    la diminution des fonctions h  patiques li  es    l'  ge
4. le syndrome de Gougerot-Sj  gren :
 - a- Est un syndrome sec
 - b- Est une lymphoexocrinose li  e    un trouble de l'immunit   cellulaire et humorale avec anticorps
 - c- Est une lymphoexocrinose li  e    un trouble de l'immunit   cellulaire et humorale avec antig  ne
 - ☒ d- Est caract  ris   par une asialie ou d'une hyposialie + xerophthalmie + s  cheresse des fosses nasales + tum  faction des glandes parotides
 - e- Est caract  ris   par une s  cheresse buccale + exophthalmie + s  cheresse des fosses nasales + tum  faction des glandes parotides
5. Le diagnostic biologique de La polyarthrite rhumato  de :
 - ☒ a- A la CRP
 - b- Au dosage des IgM avec une valeur sup  rieure    10 UI/mL
 - c- Au TP
 - d- NFS et TP
 - ☒ e- Au la CRP + Au dosage des IgM avec une valeur sup  rieure    20 UI/mL
6. Parmi les signes du TIC DOULOUREUX DE TROUSSEAU :
 - a- Douleurs unilat  rales sur tout visage

A D

A

A B

A C

b c d e

- b- Douleurs correspondant à l'un des territoires sensitifs du trijumeau
- c- Douleurs fulgurantes, très intenses, à type de brûlures, broiement, éclatement ou de décharges électriques
- d- Douleurs ressenties durant quelques secondes à 2 minutes.
- e- Douleurs unilatérales sur une partie du visage

7. Sénescence des tissus dentaires se manifeste par :

- a- Une diminution du taux de collagène
- b- Un élargissement du volume pulpaire.
- c- Une résorption de la dentine sclérotique.
- d- Un accroissement du taux des caries radiculaires.
- e- L'apparition des fêlures au niveau de l'email.

d

8. La cariosusceptibilité observée lors de l'avancée en âge est due à :

- a- L'augmentation du flux salivaire.
- b- La diminution du pouvoir tampon de la salive.
- c- La neutralisation du PH buccal.
- d- La modification histologique des glandes salivaires.
- e- La perte d'autonomie et de la dextérité manuelle.

b - c

b

9. L'usure des surfaces oclusales est compensé par :

- a- Une fibrose collagénique du chorion gingival
- b- Élargissement des cavités de résorption de l'os alvéolaire.
- c- Épaississement du ligament alvéolo-dentaire.
- d- Une hypercémentose.
- e- Prolifération des cellules ostéogéniques.

d

10. Les modifications des muqueuses buccales avec l'âge correspondent à :

- a- L'altération des facteurs nutritionnels ou systémiques.
- b- La diminution de l'épaisseur de l'épithélium
- c- L'augmentation du taux de kératinisation.
- d- La réduction des capacités de remodelage.
- e- L'atrophie tissulaire.

c

11. La presbyphagie est un phénomène relatif à :

- a- Une fragilisation des muscles masticatoires.
- b- Une atrophie des glandes salivaires.
- c- Une altération du goût et de l'olfaction.
- d- Un ralentissement de l'influx nerveux.
- e- Dégradation de la coordination motrice.

12. La réduction de 30% à 50% du taux de carie chez le vieillard consécutive à :

- a- L'utilisation du fluor.
- b- La consommation d'aliments fibreux.
- c- L'application d'un traitement topique antifongique.

a

— PLATF O R M E —
RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

- d
d- L'auto-nettoyage important de la cavité buccale.
e- L'hydratation du patient.

13. Parmi les étiologies hypothétiques d'une névralgie faciale idiopathique :

- a- conflit vasculo-nerveux
b- boucles vasculaire
c- manque de vitamines
d- tumeurs nerveuses
e- tumeurs vasculaires

14. Un aphte se présente comme :

- a- une ulcération de la muqueuse, solitaire de quelques millimètres de diamètre, à fond jaune entourée par un halo rouge
b- Des ulcérations de la muqueuse groupées, de quelques millimètres de diamètre, à fond jaune entourée par un halo rouge
c- une ulcération de la muqueuse, solitaire de quelques millimètres de diamètre, à fond blanchâtre entourée par un halo rouge
d- une ulcération rougeâtre très douloureuse
e- une ulcération de la muqueuse, solitaire de quelques millimètres de diamètre, à fond jaune entourée par un halo rouge pouvant être traitée par l'acyclovir

15. burning mouth syndrome :

- a- Est une entité douloureuse essentielle de la muqueuse bucco pharyngée+ langue + palais+ gencive +lèvres+ pharynx
b- Est une entité douloureuse secondaire de la muqueuse bucco pharyngée+ langue + palais+ gencive +lèvres+ pharynx + dents
c- Est une entité douloureuse essentielle de la langue + palais+ gencive +lèvres + dents
d- Est une entité douloureuse essentielle de la muqueuse bucco pharyngée+ langue +lèvres+ pharynx + dents
e- Est une douleur continue, chronique, le plus souvent bilatérale, symétrique, à type de brûlure

16. L'hydroxyzine :

- a b
a- Sa demi-vie d'élimination 29h chez le sujet âgé
b- A une action sédatrice +antiallergique + anti-arythmique +anti-sécrétoire
c- A une action contre les vomissements
d- Son délai d'action est court : environ 10minutes
e- Son taux plasmatique maximum est obtenu en 4 heures

17. Le MEOPA :

- a
a- Est une sédation consciente par inhalation
b- Est une sédation qui a peu d'effet sur la conscience
c- Il s'agit d'une inhalation consciente juste préopératoire, d'un mélange équimolaire de N03/02
d- Il s'agit d'une inhalation consciente juste per opératoire, d'un mélange équimolaire de N02/02
e- Il s'agit d'une méthode anesthésique utilisée pour soins et avulsions dentaires

PLATFORME

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

18. Les Contre-indications absolues du MEOPA ::

a- les encombrements naso-pharyngés et bronchiques

b x b- l'insuffisance hépatique ou rénale,

c- La drépanocytose et greffes d'organes

d- les patients classés A.S.A. III et au-delà,

e x c- les insuffisances respiratoires sévères,

19. une narcose :

a- est une nécrose post anesthésique

b- est une analgésie parentérale

c- est un sommeil provoqué artificiellement

d- est un type de sédation vigile

e- est un type de sédation

20. Névralgie essentielle du nerf glossopharyngien :

a c e a- Débute dans la région des amygdales ou à la base de la langue et peut irradier à l'oreille homolatérale.

b- Débute dans la région des amygdales ou à la base de la langue et peut irradier à l'oreille bilatérale.

x c- Parfois, une hyperactivité vagale provoque une pause sinusale avec une syncope;

d- Débute dans la région de la base de la langue et peut irradier au plancher buccal

e- Les douleurs peuvent se produire de façon quotidienne ou une fois toutes les deux semaines.

